

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : vignotte
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	13	
Matricaire	48	
Vulpin	25	
Ray-grass	24	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d2	Aoû-d1	45 gr/m²
Brome stérile 115	Brome stérile -10	Date de semis du couvert : Non définie	Brome stérile -7	Brome stérile 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Date de destruction : Non définie	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 103	Vulpin -10	Brome stérile -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Matricaire -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
		Vulpin -4		
		Ray-grass -7		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Très couvrante	Bineuse : Oct-d1	Nov-d3 Nov-d2 Oct-d2	Brome stérile 84
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Houe rotative :	Oct-d1	Matricaire 12
Matricaire 0	Matricaire -2	Herse étrille :		Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin -2	Brome stérile -6		Ray-grass 69
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Matricaire -1		
		Vulpin -6		
		Ray-grass -4		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Brome stérile 71	Brome stérile -10	Brome stérile -9	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Nov-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2 Mar-d3	Brome stérile 46
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile -3		Matricaire 12
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Vulpin 38
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Ray-grass 28
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d3	Pas de labour	450 gr/m²
Brome stérile 16	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3	Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1 Fév-d3	Brome stérile 0
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile -2		Matricaire 28
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -5		Vulpin 19
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Ray-grass 16
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Mar-d2 Fév-d2 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Mar-d3	Pas de labour	5 gr/m²
Brome stérile 2	Brome stérile -10	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 37	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d3 Mai-d2 Mar-d3	Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Matricaire 18
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -3		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Brome stérile 71	Brome stérile -10	Brome stérile -9	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Nov-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Brome stérile 47
Brome stérile -2	Brome stérile -2	Brome stérile -1		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire -1		Vulpin 39
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -1		Ray-grass 28
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -1		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis

Mar-d2

Brome stérile	16
Matricaire	48
Vulpin	38
Ray-grass	35

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Brome stérile	-6
Matricaire	-6
Vulpin	-6
Ray-grass	-6

Interculture

Date des faux semis :
Jul-d3
Date de semis du couvert :
Aoû-d1
Date de destruction :
Mar-d1

Brome stérile	-1
Matricaire	-1
Vulpin	0
Ray-grass	-1

Date de labour

Pas de labour

Brome stérile	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

Densité de semis

70 gr/m²

Brome stérile	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

Entre rangs

12.5 cm

Brome stérile	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Ray-grass	0

Variété

Moyennement couvrante

Brome stérile	-1
Matricaire	-1
Vulpin	-1
Ray-grass	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Avr-d3 Avr-d2
Houe rotative :
Herse étrille :

Brome stérile	-2
Matricaire	-4
Vulpin	-3
Ray-grass	-3

Désherbage chimique

Mai-d3 Mai-d2 Mar-d1

Score annuel

Brome stérile	7
Matricaire	36
Vulpin	28
Ray-grass	24