

Scénario : 1
 Exploitation : 1- ROTAB : Archigny
 Parcelle : R6
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	46 (46)
Matricaire	50 (50)
Mouron	70 (70)
Panic pied-de-coq	56 (56)
Renouée persicaire	49 (49)

Scénario :
Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Jun-d1 50% Aoû-d1 50% Mai-d1 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Chénopode 38 Matricaire 28 Mouron 67 Panic pied-de-coq 113 Renouée persicaire 57	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -7 Matricaire -5 Mouron -10 Panic pied-de-coq -9 Renouée persicaire -12	Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 29 Matricaire 21 Mouron 54 Panic pied-de-coq 97 Renouée persicaire 43
Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -2 Matricaire -1 Mouron -3 Panic pied-de-coq -6 Renouée persicaire -2		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire -4	Oct-d3	12 gr/m ²
Chénopode 8 Matricaire 26 Mouron 2 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -4 Matricaire -4 Mouron -4 Panic pied-de-coq -4 Renouée persicaire -4	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Matricaire 22 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode 52 Matricaire 37 Mouron 91 Panic pied-de-coq 95 Renouée persicaire 97	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -11 Matricaire -8 Mouron -13 Panic pied-de-coq -5 Renouée persicaire -15	Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire -1	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 35 Matricaire 24 Mouron 68 Panic pied-de-coq 76 Renouée persicaire 72
Chénopode -2 Matricaire -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2 Renouée persicaire -2	Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -4 Matricaire -3 Mouron -7 Panic pied-de-coq -11 Renouée persicaire -7		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50% Avr-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -9	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -12	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3		Chénopode 38
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 27
Matricaire 0	Matricaire 0	Chénopode -2		Mouron 73
Mouron 0	Mouron 0	Matricaire -1		Panic pied-de-coq 74
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Mouron -3		Renouée persicaire 79
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Panic pied-de-coq -6		
		Renouée persicaire -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0	Nov-d3	12 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Matricaire 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 18	Matricaire -4	Mouron 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Panic pied-de-coq 0	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Renouée persicaire 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4		Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 14
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Mai-d2 50% Avr-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 37	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -0	Matricaire 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron -11	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 95	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire 97	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4		Chénopode 38
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 26
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -7		Mouron 71
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -11		Panic pied-de-coq 76
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6		Renouée persicaire 74

Année 7 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -1	Matricaire 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -9	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 38
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 26
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Mouron 72
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6		Panic pied-de-coq 74
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -3		Renouée persicaire 77