

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

EARL Lhotellier  
NOQ  
Brunisol

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	14	
Vulpin	71	
Chénopode	0	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d3 Folle-avoine 41 Vulpin 104 Chénopode 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Blé d'hiver Fort Folle-avoine -10 Vulpin -10 Chénopode -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Aoû-d3 Folle-avoine -1 Vulpin -4 Chénopode -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0
<b>Entre rangs</b> 20 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	<b>Variété</b> Très couvrante Folle-avoine -2 Vulpin -2 Chénopode -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Oct-d2 Avr-d2 Jan-d2 Houe rotative : Nov-d2 Mar-d3 Jan-d2 Herse étrille : Mai-d3 Mar-d1 Aoû-d2 Folle-avoine -14 Vulpin -12 Chénopode -9	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1 Nov-d2 Jan-d2	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 14 Vulpin 76 Chénopode 0