




Scénario : Scénario Vincent
 Exploitation : essai Vincent
 Parcelle : essai 2
 Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	42 (49) 
Ray-grass	43 (51) 
Gaillet	21 (24) 

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Chénopode 31 Ray-grass 96 Gaillet 25	Étouffement culture Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Chénopode -10 Ray-grass -10 Gaillet -10	Interculture Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Août-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -5 Ray-grass -9 Gaillet 0	Date de labour Août-d3 Chénopode -4 Ray-grass -11 Gaillet -8	Densité de semis 45 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 17 cm Chénopode -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 10 Ray-grass 63 Gaillet 5

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Gaillet 95</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>		<p>Chénopode 8</p> <p>Ray-grass 55</p> <p>Gaillet 87</p>

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Gaillet 3</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Gaillet -0</p>	<p>Mar-d3</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Ray-grass -9</p> <p>Gaillet -9</p>	<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Bineuse : Mai-d2 Mai-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Ray-grass -0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2</p>	<p>Chénopode 52</p> <p>Ray-grass 15</p> <p>Gaillet 0</p>