

Exploitation : Alsace
Parcelle : nouvelle rotation
Type de sol : limon argilo sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée liseron	48	
Chénopode	45	
Panic pied-de-coq	22	

Systeme de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

<p>Date de semis</p> <p>Mai-d1</p> <p>Renouée liseron 128</p> <p>Chénopode 52</p> <p>Panic pied-de-coq 58</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Avr-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d2</p> <p>Date de destruction : Avr-d2</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>65 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>25 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d2 Mai-d3</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Panic pied-de-coq -9</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mai-d2 Avr-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Renouée liseron 117</p> <p>Chénopode 45</p> <p>Panic pied-de-coq 43</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Renouée liseron 137</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Panic pied-de-coq 52</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1</p> <p>Date de destruction : Mar-d1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>11 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>Bineuse : Mai-d1 Avr-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2</p> <p>Renouée liseron -20</p> <p>Chénopode -9</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p>	<p>Avr-d2 Avr-d3</p>	<p>Renouée liseron 114</p> <p>Chénopode 50</p> <p>Panic pied-de-coq 47</p>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Nov-d2</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Chénopode 6</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Mar-d1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Nov-d3 Avr-d2</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 9</p> <p>Panic pied-de-coq 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Panic pied-de-coq -10</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>225 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Panic pied-de-coq -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Avr-d2 Oct-d1 Oct-d2</p>	<p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>